

# 5 falsi miti sulla Leishmaniosi

La Leishmaniosi si trasmette solo con la **puntura del pappatacio o flebotomo**, un insetto notturno. Il protozoo (*Leishmania infantum*) che causa la malattia si moltiplica nell'intestino delle femmine di pappatacio, e viene espulso durante una nuova puntura. **Ridurre il più possibile il rischio di puntura è quindi la via di prevenzione più efficace.** Per salvaguardare il benessere del nostro amico peloso, e garantire ad esempio la sua passeggiata serale in tutta sicurezza, si possono usare prodotti veterinari no-feeding come collari e spot-on specifici per ridurre il rischio di puntura del vettore, da associare alla vaccinazione già disponibile. **È consigliabile rivolgersi al veterinario per chiedere consigli, fare una visita annuale e gli esami del sangue specifici.**

## Ecco dunque 5 falsi miti sulla Leishmaniosi:

1

### **La Leishmaniosi canina non è grave e guarisce da sola**

**FALSO.** Se è vero che non tutti i cani che vengono contagiati sviluppano la malattia, è però vero che non riescono comunque a debellare il protozoo. Se la malattia è ben curata, può essere tenuta sotto controllo, in caso contrario può progredire fino all'insufficienza renale cronica e/o causare la perdita della vista (uveite), e può portare anche alla morte.

2

### **Il mio cane è già stato contagiato, non ha bisogno di protezione**

**FALSO.** Le misure di prevenzione sono molto utili anche in questi casi, perché evitano che un cane punto dal pappatacio (portatore sano o ammalato), possa a sua volta trasmettere l'infezione ad altri cani.

3

### **Un cane malato o infetto rappresenta un grande rischio per gli esseri umani**

**VERO/FALSO.** La Leishmaniosi è una zoonosi, cioè una malattia che può colpire anche gli esseri umani. Non può però essere trasmessa in modo diretto né da un cane a un altro né da un cane a un essere umano, perché è sempre necessaria la puntura di un pappatacio, che è l'unico vettore della *Leishmaniosi*.

4

### **La Leishmaniosi umana è un'epidemia in Italia**

**FALSO.** Nell'essere umano l'infezione decorre asintomatica nella stragrande maggioranza dei casi e in Italia si verificano pochi casi l'anno, circa 200. Il rischio che si sviluppi la malattia è maggiore nei bambini piccoli e nelle persone immunodepresse o che vivono in condizioni disagiate, con scarsa igiene. La diagnosi precoce consente di guarire dalla malattia nel 98% dei casi senza conseguenze.

5

### **Per evitare la puntura dei pappataci si può usare qualsiasi prodotto antiparassitario**

**FALSO.** I pappataci non si comportano come le pulci e le zecche. A differenza delle zecche, un pappatacio infetto trasmette immediatamente all'ospite la forma infettante di *Leishmania*. Studi di laboratorio e di campo hanno dimostrato che la migliore protezione si ottiene con prodotti specifici in grado di ridurre il rischio di puntura e quindi di trasmissione del protozoo. È importante parlare con il veterinario per informarsi sul tipo di protezione più indicata per il proprio cane.

